IX. Minéralogie et biochimie des surfaces

Réflectance spectrale et/ou directionnelle

E.S. Arcybashev & S.V. Belov, 1958, The reflectance of tree species, In *Russian Data on Spectral Reflectance of Vegetation, Soil, and Rock Types* (D. Steiner & T. Guterman, eds), pp. 232. Juris Druck + Verlag Zurich.

G. Vane & A.F.H. Goetz, 1988, Terrestrial imaging spectroscopy, *Remote Sensing of Environment*, 24:1-29.

Réflectance des sols

Sol argileux

Réflectance spectrale des sols : les modèles de mélange

Viking 1 Lander, Mars, 20 juillet 1976

Un radiomètre multispectral :

- 0.465 μm (bleu)
- 0.545 μm (vert)
- 0.669 μm (rouge)
- 0.871 μm (infrarouge)
- 0.946 μm (infrarouge)
- 0.993 μm (infrarouge)

Un modèle de mélange :

$$\rho_s(\lambda) = \sum_{i=1}^n f_i \times R_i(\lambda)$$

avec f_i la fraction et $R_i(\lambda)$ la réflectance du minéral i

⇒ palagonite = argile provenant de l'hydratation brutale du verre volcanique

⇒ andésite = roche volcanique gris-noir contenant entre 52% et 63% de silice

Image (30 km × 37 km) de la mine de Cu-Au-Ag d'Escondida (désert de l'Atacama, Chili) acquise par Terra-ASTER (*Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer*) le 23 avril 2000
 ⇒ télédétection de la minéralogie

1 : 0.52-0.60 μm	4 : 1.600-1.700 μm	10 : 8.125-8.475 μm
2 : 0.63-0.69 μm	5 : 2.145-2.185 μm	11 : 8.475-8.825 μm
3 : 0.76-0.86 μm	6 : 2.185-2.225 μm	12 : 8.925-9.275 μm
	7 : 2.235-2.285 μm	13 : 10.25-10.95 μm
	8 : 2.295-2.365 μm	14 : 10.95-11.65 μm
	9 : 2.360-2.430 μm	

Composition colorée
des bandes 1, 2, 3

Composition colorée
des bandes 4, 6, 8

Carte minéralogique de la Mars (Nili Fossae) obtenue à partir d'images THEMIS (*Thermal Emission Imaging System*) sur la sonde Mars Odyssey de la NASA. Les bandes 5 ($9.35 \mu\text{m}$, 1070 cm^{-1}), 7 ($11.04 \mu\text{m}$, 906 cm^{-1}), et 9 ($12.57 \mu\text{m}$, 796 cm^{-1}) sont codées en bleu, vert et rouge. A l'intérieur de cette vaste région basaltique, les zones riches en olivine apparaissent en magenta et pourpre.

Hand sample of Hawaiian olivine basalt

(Geology and Geophysics, University of Hawaii. PSRD photo)

<http://themis.asu.edu/>

T.M. Hoefen, R.N. Clark, J.L. Bandfield, M.D. Smith, J.C. Pearl, & P.R. Christensen (2003) Discovery of olivine in the Nili Fossae region of Mars. *Science*, v. 302, p. 627-630.

La végétation = source de bruit pour le géologue

- ▶ Elle cache les surfaces terrestres : état de surface, composition minéralogique des sols, topographie

La végétation = source d'information sur les processus de surface

- ▶ Elle joue un rôle primordial dans les échanges avec l'atmosphère
→ changements climatiques (échanges de CO_2)
- ▶ Elle contribue à la stabilité des sols
→ érosion gravitaire, éolienne ou pluviale
- ▶ Elle joue un rôle important dans la physico-chimie des sols
→ respiration (rapport C/N), altération chimique (carbonates)
- ▶ Elle est un indicateur de l'activité volcanique
→ réseau hydrothermal, dégazage (SO_2 , CH_4 , CO_2 , etc.)

Approche

- ▶ Compréhension de l'absorption et de la diffusion du rayonnement électromagnétique par la matière (eau, pigments, parois cellulaires, etc.)
- ▶ Modélisation des propriétés optiques des couverts végétaux à différentes échelles (de la cellule à l'écosystème)
- ▶ Conception d'indices de végétation « biochimiques » et analyse de sensibilité

▶ Cartographie de la composition biochimique des plantes et applications

▶ Inversion des modèles sur des images aéroportées ou spatiales

▶ Mesure de la réflectance spectrale à différentes échelles

sens direct

sens inverse

Réflectance des couverts végétaux dans le domaine optique (0.4-2.5 μm)

$$R(\lambda, \theta_s, \varphi_s, \theta_v, \varphi_v) = \frac{L(\lambda, \theta_s, \varphi_s, \theta_v, \varphi_v)}{E(\lambda, \theta_s, \varphi_s)}$$

La réflectance du couvert dépend :

- de la configuration de mesure
- de la réflectance du sol
- des propriétés optiques des feuilles
- de l'architecture du couvert
 - indice foliaire (LAI = *Leaf Area Index*)
 - distribution d'inclinaisons des feuilles
 - diamètre des feuilles / hauteur du couvert
 - de la fraction de couverture
 - etc.
- des conditions d'éclairement : diffus / direct

Un couvert végétal

5 m

Une feuille

150 μm

Un sol

50 cm

La Terre

70 km

Propriétés optiques des feuilles

T.R. Sinclair, M.M. Schreiber & R.M. Hoffer, 1973, Diffuse reflectance hypothesis for the pathway of Solar radiation through leaves, *Agronomy Journal*, 65:276-283

M É M O I R E
sur les Couleurs des Végétaux.

PAR M. ACHARD.

P R E M I E R E P A R T I E.

Les Physiciens font encore très peu d'accord sur la cause à laquelle l'on doit attribuer la couleur des fleurs & des autres parties des végétaux ; il paroît même que ce sujet n'a encore été examiné par personne dans un détail suffisant. Le célèbre Hales, qui dans l'analyse qu'il a faite des végétaux paroît avoir eu principalement en vue de déterminer la quantité d'air qu'ils contiennent, attribue dans sa *Statique des Végétaux* Chap. 7. p. 277 les couleurs des fleurs aux principes aériens subtilisés. Bécher dans sa *Physique souterraine* & Stahl dans ses *Éléments de Chymie* attribuent la couleur verte des végétaux au fer que l'on trouve, suivant les expériences que Léméri rapporte dans un Mémoire imprimé dans les *Mémoires de l'Académie de Paris de l'Année 1706*, dans les cendres des matières végétales. Henckel paroît n'être pas décidé, s'il doit attribuer la couleur verte des végétaux au fer ou au cuivre. L'illustre Pott attribue dans sa *Lithogéognosie* indistinctement la couleur de tous les corps naturels au phlogistique.

Composition biochimique des feuilles

- eau (vacuole) : 90-95%
- matière sèche (parois cellulaires) : 5-10%

- cellulose : 15-30%
- hémicellulose : 10-30%
- protéines : 10-20%
- lignine : 5-15%
- amidon : 0.2-2.7%
- sucres
- etc.

- chlorophylles *a* and *b* (chloroplastes)
- autres pigments

- caroténoïdes : β -carotène, xanthophylles
- anthocyanes, flavones
- pigments bruns
- etc.

Structure anatomique d'une feuille de dicotylédone

coupe transversale

← épiderme supérieur

← parenchyme palissadique

← parenchyme lacunaire

← épiderme inférieur

épiderme inférieur

← stomate

Interception de la lumière

D.W. Lee & J.B. Lowry, 1975, Physical basis and ecological significance of iridescence in blue plants, *Nature*, 254:50-51.

D.W. Lee, 1986, Unusual strategies of light absorption in rain-forest herbs, in *On the Economy of Plant Form and Function* (T.J. Givnish, ed), Cambridge University Press, pp. 105-131.

C.A. Shull, 1929, A spectrophotometric study of reflection of light from leaf surfaces, *Botanical Gazette*, 87:583-607.

Propriétés optiques spectrales

Trifolium pratense

Propriétés optiques spectrales : variation de la teneur en pigments

Propriétés spectrales : variation de la structure anatomique

maïs (*Zea mays*)

tournesol (*Helianthus annuus*)

Réflectance de la végétation

Betterave à sucre - Brooms Barn

AVIRIS, MODIS, MERIS

Savane - Niger

POLDER, MISR

Chlorophylle ($\mu\text{g cm}^{-2}$)

Matière sèche (g m^{-2})

G. Le Maire, 2005, Modélisation des flux et des stocks de carbone à l'échelle régionale (forêts et cultures), Ph.D. Thesis, University of Paris-Sud, 201 pp.

AVIRIS

airborne • visible • infrared • imaging • spectrometer

Eau (mg H₂O / g poids sec)

Santa Monica Mtns: Canopy Water Content

S.L. Ustin, D.A. Roberts, J.E. Pinzón, S. Jacquemoud, M. Gardner, G. Scheer, C.M. Castañeda & A. Palacios-Orueta, 1998, Estimating canopy water content of chaparral shrubs using optical methods, *Remote Sensing of Environment*, 65:280-291.

X. Exobiologie

De la végétation sur Mars ?

- **Johann H. Lambert** (1728-1777), mathématicien, physicien et philosophe allemand d'origine française, suggère la présence d'une végétation rouge sur Mars.
- **Emmanuel Liais** (1826-1900), astronome, botaniste et explorateur français, se livre également des observations de la planète Mars : dans son ouvrage "*L'espace céleste*" publié en 1865, il émet l'hypothèse que les taches de faible albédo observées à la surface sont liées à la présence de végétation plutôt qu'à la présence d'eau → hypothèse en vigueur jusque vers les années 1950.
- **Camille Flammarion** (1842-1925), astronome français, reprend cette idée en 1873 dans son ouvrage "*La planète Mars*". Il estime que les surfaces ocre de Mars sont recouvertes d'une végétation ... rougeâtre ! « Après tout, pourquoi la végétation martienne serait-elle verte », s'interroge-t-il ?
- **William H. Pickering** (1858-1938), astronome américain, avance en 1892 que les grandes étendues sombres observées sur Mars devaient être formées par un prodigieux entrelacement d'espèces végétales qui expliquent la teinte verdâtre observée.
- **Percival Lowell** (1855-1916), astronome amateur américain aisé, est connu pour avoir soutenu la présence de canaux sur Mars. Doté d'une imagination débridée, il imagine qu'une bande de végétation d'une trentaine de kilomètres borde les principaux canaux...

- **Gavriil A. Tikhov** (1875-1960), astrophysicien et astrobiologiste russe, a mené de nombreuses études sur les propriétés optiques de végétaux terrestres poussant sous des climats extrêmes, et a montré que la bande d'absorption de la chlorophylle pouvait s'élargir jusqu'à disparaître complètement.
- **Gerard P. Kuiper** (1905-1973), astronome américain d'origine néerlandaise, après avoir détecté le CO₂ dans l'atmosphère martienne, a supposé en 1947 que des végétaux de type lichens (« a touch of moss green ») puissent exister à la surface.
- **William M. Sinton** (1925-), astronome américain, a attribué en 1957 des transitions vibrationnelles mesurées sur des spectres infrarouge à la présence de végétation → interprétation infirmée en 1963 (eau lourde atmosphérique).
- **Tibor Ganti** (1933-), **Eörs Szathmary** (1959-) et **Andras Horvath** (1941-), scientifiques hongrois, ont prétendu en 2001 avoir trouvé des signes de végétation sur des images de la mission Mars Global Surveyor (MGS).
- **Carol Stoker** () et **Pascal Ashwanden** (), du NASA Ames Research Center, ont détecté en 2002 sur les images multispectrales de la sonde Pathfinder (15 bandes spectrales entre 440 et 1100 nm) des caractéristiques spectrales de la chlorophylle...

« Paysage probable de Mars : une basse
végétation de couleur bleue sur un sol rouge »
G. Tikhov, 1960, *L'énigme des planètes*

Mars Global Surveyor Mars Orbiter Camera
Horvath et al., 2004, 35th COSPAR Conference
© NASA/JPL/Malin Space Science Systems

« life on other planets might take unfamiliar or even unrecognizable forms » Stephen Jay Gould

Lumière cendrée de la Lune

Simulation de la variation journalière de l'albédo global d'un modèle de Terre sans nuages. Les courbes rose, rouge, verte et bleue correspondent à 750, 650, 550 et 450 nm

Spectre de la lumière cendrée montrant un *Vegetation Red Edge* de l'ordre de 8-10%

E.B. Ford, S. Seager & E.L. Turner, 2001, Characterization of extrasolar terrestrial planets from diurnal photometric variability, *Nature*, 412:885-887.

L. Arnold, S. Gillet, O. Lardiere, P. Riaud & J. Schneider, 2002, A test for the search for life on extrasolar planets, *Astronomy & Astrophysics*, 392:231-237.

LUCAS

Lumière
Cendrée en
Antarctique par
Spectroscopie

l'Observatoire
de Paris

Observatoire de
Haute-Provence

IPGP
INSTITUT DE PHYSIQUE
DU GLOBE DE PARIS

Université
Nice SOPHIA ANTIPOLIS

université
PARIS
DIDEROT
PARIS 7